



NOBBE ORTHOPEDICS, INC.

www.nobbeorthopedics.com

3010 State Street
Santa Barbara, CA
93105
(805) 687-7508 tel
(805) 687-6251 fax

2345 S. Broadway, Ste E
Santa Maria, CA
93454
(805) 925-8290 tel
(805) 346-8713 fax

1645 Donlon St, Ste 102
Ventura, CA
93003
(805) 339-0670 tel
(805) 339-0493 fax

Instrucciones Para Usar y Cuidar el Cranial Remolding Orthosis

1. Su bebe eventualmente usara el casco las 23 horas al dia, pero necesitara varios para adaptarse al uso del casco. Siga el programa de horario para aumentar gradualmente el tiempo de uso. El horario de uso es disenado para prevenir problemas de la piel y ayudar a su bebe a adaptarse al casco.

DIA	CON	SIN	SIESTA	NOCHE
1	1 hr	1 hr	No	No
2	2 hrs	1 hr	No	No
3	4 hrs	1 hr	Si	Si
4	8 hrs	1 hr	Si	Si
5	23 hrs	1 hr	Si	Si

2. Este programa de uso proporciona una forma segura para aclimatarse al uso del casco. Al quinto dia se considera como uso a tiempo completo y el casco solo puede ser removido por una hora al dia. El casco debe ser removido y limpiado mientras bane a su bebe.
3. Remueva el casco si su bebe tiene fiebre o sintomas de gripa. Vuelva a poner el casco a tiempo completo lo mas pronto posible. Si su bebe no a podido usar el casco durante 48 horas, empiece otra vez con el horario de uso durante unos dias para ayudar al bebe a adaptarse a usar el casco nuevamente.
4. Si su bebe ha sido diagnosticado con torticolis, el torticolis debe ser tratado con el fin de lograr la corrección de forma de la cabeza del bebe. Si su terapeuta o medico le a dado ejercicios para el cuello de si bebe, remueva el casco durante los ejercicios y vuelva a poner el casco tan pronto aiga terminado.
5. Cada dia, a la hora del bano, quite y limpie el casco. Solamente utilice alcol para limpiar el interior del casco. Otros productos como jabon, agua, cloro, o perfume pueden causar irritacion de la piel y no deben ser utilizados en el interior del casco. Vigorosamente, talle el interior del casco con una tualla limpia que contenga alcol o con un cepillo de dientes. Ponga el casco al revs para que se seque. Un ventilador puede ser utilizado para ayudar a aliviar el olor que a veces se puede desarrollar en el interior del casco.
6. Lave la cabeza de su bebe diariamente, y vuelva aplicar el casco cuando la cabeza se su bebe y el casco esten secos. El casco no debe mojarse y debe ser removido durante natacion.

7. Durante los primeros días, su bebé puede sudar mucho hasta que su cuerpo se acostumbre al casco. Esto es normal, y durante este tiempo, el casco puede ser removido por algunos cuantos minutos durante el día para secar la cabeza de su bebé y el casco con una toalla o una secadora de pelo. No use polvos o lociones en la cabeza del bebé o en el interior del casco. Estos productos pueden contener ingredientes que pueden irritar la piel de su bebé. Vista a su bebé con ropa más fresca para prevenir que sude.
8. Si su bebé desarrolla un sarpullido, consulte a su doctor inmediatamente.
9. Si usted necesita cortar el pelo a su bebé durante el tratamiento del casco, no le vaya a resurar todo el pelo. El contacto del casco contra la cabeza de su bebé puede causar irritación cuando le empiece a crecer de nuevo el pelo. Trate de mantener el pelo de su bebé al mismo nivel durante todo el tratamiento.
10. Revise la piel de su bebé cada vez que el casco sea removido. Llámenos inmediatamente si nota algún lugar rojo que dure más de 10 minutos después de remover el casco. Esto puede significar que el casco ocupe un ajuste.
11. Si su bebé no ha usado el casco por más de 48 horas, esto puede causar problemas con el ajuste del casco, ya que la cabeza del bebé está creciendo continuamente. Limite el uso fuera del casco, y si ocupa asistencia llámenos lo más pronto posible.
12. Cada vez que usted le ponga el casco a su bebé, revise el casco completamente. Las partes flojas pueden ser un peligro para el bebé.
13. Mantenga el casco lejos de cualquier animal.
14. El casco debe ser usado como fue resetado, las 23 horas al día, para que haya crecimiento en las áreas necesarias. Aun después del tratamiento, el casco debe ser usado las 23 horas del día hasta que el médico este de acuerdo que el tratamiento está completo. Interrupción temprana del tratamiento contra el consejo médico puede resultar en corrección incompleta de la forma de la cabeza de su bebé. Continuar con el uso del casco contra el consejo médico puede restringir el crecimiento del cráneo y afectar el desarrollo del cerebro.
15. Explique el propósito del casco a las personas que se encarguen de cuidar a su bebé. Ensénelos a aplicar y remover el casco correctamente.
16. Si usted tiene cualquier pregunta acerca del cuidado de su bebé, llámenos y nosotros le ayudaremos.